

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之十

勦胎 第九十一問

經濟論勦證肺經受風寒因咳嗽肺停冷血生痰致
使肺臟有熱睡臥不安故成勦胎咽喉間如拽鋸之
聲小兒若有此候可服通關梅花飲子并半夏丸及
保壽散小歸命散解肌散三兩服自安若見勦胎如
痰証喉間若拽鋸聲者乃肺感風邪上氣喘急面唇
青色項下有深凹陷痰涎粘如膠漆口生腥臭惡氣
舌縮者皆不可治也

梅花飲子

治嬰孩驚熱潮熱虛熱積熱五臟蘊熱上焦壅
熱手足心熱喉中多痰面色或紅或白變蒸啞
呀鼻流清涕氣急肝肺壅熱目赤咳嗽或被人
物所驚夜啼睡臥不安心中驚怖情緒不快或
傷寒漸安尚有餘熱未除亦宜進此三兩服常
服鎮心壓驚化痰退熱安神可除未來之患通
關

南硼砂

馬牙消

另研

芒硝

另研

甘草

炙各半兩

人參一兩辰砂二錢半片腦一錢麝香各一

右八味爲末。以磁器收之。遇有此證服一匙。麥
門冬湯調下。氣喘咳嗽。桑白皮湯調下。常服薄
荷湯下。

吳子玉方

日色信石一錢生兩星

枯礬各一錢礬砂各一錢蘇豆粉

雄黃各一錢半

右爲末糊丸如蘿蔔子大。臨臥用冷茶清吞下。

五九

半夏丸

治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短
氣煩悶風壅痰實頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡
心神思昏憤心忪面熱涕唾稠粘並皆治之。

白礬

枯過二兩五錢

半夏

二兩湯洗去滑薑汁浸一宿

右爲細末生薑自然汁爲丸梧桐子大每服十
九或二十九食後臥時生薑湯下小兒丸如麻
子大

保壽散

治證詳見五十問

白茯苓

新羅參

川雄

牙硝

甘草

炙各一兩

片腦

四兩

麝香

一百

牛黃

少許無亦得

右入味細研入錫合內收之湯使如後金粉散

小歸命散

治小兒變蒸傷寒潮熱驚熱嘔呀鼻流清涕咳嗽渾身溫壯咽喉有涎兼前項傷寒等證及止驚熱墜涎安神百病不生。

白茯苓

人參

白朮

各半兩

甘艸

三錢

辰砂

二錢

片腦

麝香

各少許

右七味爲末。每服半錢。薄荷湯調下。

解肌散

治嬰孩傷寒風面部紅赤。咳嗽。渾身壯熱。有前
項等形。證兼服人參散後。得熱退。可觀。患勢輕
重。若患稍輕。脈候不洪數。通不大赤。不加煩燥。
然須呻吟。諷語。此爲輕可之候。但只進此。

人參

釣藤

桔梗

甘艸

川芎

錢

三

錢

一

錢

八

錢

杏仁

四十九箇
去皮尖

石膏

煨

麻黃

去節各
四錢

右剉散每服二錢棗一枚水一盞煎半盞服

初中傷寒先下此藥是須要仔細辨認形證若

是麻痘瘡疹便不得下此藥蓋麻痘之證則面

赤白耳珠脚膝尻骨俱冷如水身體溫壯亦經

躁譫語夢中驚笑乃是此候也若小兒傷寒等

服此解肌散漸得熱退次第可服大歸命散保

壽散輕粉白朮散等調理

白玉丸

利膈下痰涎去心胸噎塞不止并咳嗽多痰。

南星炮半夏

僵蠶

白礬

生各二錢半

各爲末杏仁七箇去皮尖巴豆一粒同研勻再用去皮生薑汁爲丸如粟米大每服一二十丸薑湯送下不拘時

瘧證 第九十二問

巢氏云瘧疾者由夏傷於暑熱結皮膚至秋因勞動血氣勝理虛而邪氣乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發小兒未能觸冒於暑而亦病瘧者乃乳母持抱解脫不避風爽者也夫風邪所傷客於皮膚而痰飲積於臟腑致令血氣不和陰陽交爭若真氣勝則邪氣退邪氣未盡故發瘧也邪氣雖退陰血尚虛邪干於真氣臟

勝熱氣未散故餘熱往來也其病正發寒熱交爭之時其氣乘臟則燥而渴留飲停滯成癰結於腸下故瘕後腸下結硬也若引飲不止小便澀者則變成癰也寒熱往來而熱乘五臟氣積不泄故煩滿寒熱相搏而擊於臟氣故腹痛也寒多熱少無汗者桂枝麻黃各半湯有汗多者柴胡桂枝湯汗多渴者白虎加桂湯小便赤熱多而渴者小柴胡湯瘧未散者鬼哭散止之寒少熱多者可服清脾湯養胃湯治脾胃冷弱者四獸飲亦可服其截瘧九子切不可用砒霜者

但可服有常山者有阿魏者真能散痞癖也熱多汗
出而渴腹疼者大柴胡湯加葛根可也其瘧後加之
冷證痞癖結塊者木香丸主之煩渴者五苓散有熱
甚者白虎湯或加桂或加人參時行壯熱者柴胡石
膏湯亦可服頭疼甚者蔥白加甘草亦可服知母麻
黃湯亦治瘧之奇劑也

桂枝麻黃各半湯

治證詳見五十三問

桂枝

芍藥

生薑

甘草

麻黃

去節各半兩

杏仁

去皮尖十二箇

大棗

二箇

右剉散每服三錢水一小盞煎八分去滓量

小加減溫服

白虎加桂湯

治證詳見五十八問

知母

三兩

甘草

一兩炙

石膏

八兩另研

粳米

三合

右剉散每服三錢水一盞煎至六分米熟為度

去滓溫服聖惠方加乾葛

小柴胡湯

治諸詳見卷二十九問

人參

去蘆

甘草

炙

黃芩

二錢

柴胡

去蘆

半夏

湯洗七次

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎

去滓溫服不拘時

柴胡桂枝湯

柴胡

八錢

黃芩

二錢

半夏

二錢

芍藥

甘草

桂枝

各三錢

右割散每服庄錢壹三片棗一枚煎食前服
鬼哭散

治止瘡疾

常山

太腹皮

白茯苓

鼈甲

醋炙

甘草

各等分

右除鼈甲甘草炙外三件不得見火用桃柳枝
各七寸同煎臨發畧吐涎不妨只用常山白茯
苓同煎亦效

清瘡散

治痺瘡脉來弦數但熱不寒或熱多寒少脘滿
不能食口苦舌乾煩渴飲水小便黃赤大便欠
利

青皮

厚朴

薑製炒

白朮

草薢

去

柴胡

茯苓

半夏

湯洗七次

黃芩

甘草

炙各等分

右制散每服三錢米泔盪生薑二片煎六分去
滓溫服不拘時

四獸飲

治五臟氣虛。喜怒不節。勞逸兼并。致陰陽相勝。結聚痰飲。與衛氣相搏。發爲瘧疾。兼治瘴瘧。最
有神效。常服溫中快膈。

半夏

茯苓

人參

白朮

草菓

橘紅

各等分

甘草

減半

右剉散。每服三錢。烏梅薑棗各一。水一盞煎服。

胡黃連散

治小兒瘧

人參

胡黃連

草菓

檳榔

甘草

柴胡

各等分

到散水一盞煎三分服

養胃湯

治外感風寒內傷生冷溫中快膈能辟山嵐瘴

氣寒癰脾胃虛寒。

厚朴

蒼朮

製

半夏

泡各兩

藿香

艸蓂仁

茯苓

人參

各半兩

甘草

炙

橘紅

各二錢半

右到散每服三錢水一盞薑七片烏梅一箇煎

六分去滓熱服兼治冷飲傷脾發為瘧疾或中
脘虛寒嘔逆惡心寒瘧加桂

又方

陳皮

去白三錢半

甘草

炙

厚朴

製

半夏

各三錢泡

人參

草薢

各二錢

白茯苓

四錢

藿香

七錢洗

青皮

去穢

三稜

煨

蓬朮

煨

大腹皮

各一錢半

蒼朮

烏梅

各五錢

右剉散每服三錢薑棗煎服

經效瘧丹

治瘡丹結瘰癧寒熱無已

真阿魏

雄黃

各二錢半

硃砂

一錢半

在沸湯泡阿魏研散雄硃和之稀麪糊丸梧桐

子大每服一九人參湯侯冷空心服瘰癧桃枝

煎冷服臨發磨一九傳鼻頭口畔

人柴胡湯加乾葛

治證詳見二十九問

柴胡

去蘆八錢

黃芩

赤芍藥

各三錢

半夏

湯泡七次切片

枳實

去穢麪炒半錢

右咬咀薑棗煎加減服之欲下加大黃半兩

木香丸

治證詳見四十六問

木香

蓬朮

砂仁

青皮

去白

朱砂

細研

代赭石

研各二錢

大丁香

一錢

川巴豆肉

紙壓去油

治爲細末和勻飛白麪糊和丸麻子大風乾每

服二圓乳傷乳汁下食傷米飲下

五苓散

治證詳見五十二問

澤瀉

二兩

猪苓

白朮

茯苓

一兩

桂

一兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服多飲
熱湯有汗出卽愈又治濕熱在裏身發黃疸濃
煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦
可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿
黃耆人參末少許服之前十六問辰砂五苓散
參用

白虎湯

治證詳見五十八問

知母

三兩

甘艸

一兩

石膏

八兩

另研粳米

右剉散每服三錢水一盞煎至六分米熟爲度
去滓溫服聖惠方加乾葛

柴胡石膏湯

治證詳見五十二問

桑白皮

黃芩

荆芥穗

各三兩

石膏

前胡

法蒨

赤芍藥

乾葛

柴胡

各五兩

升麻

二兩

右爲粗末每服二錢水一盞生薑二片淡豉十粒煎至七分去滓稍熱服小兒分作三服量大小加減不拘時候無汗加麻黃五味子半夏。

蔥白湯

治頭疼不止身痛熱渴小便赤黃脉浮數無汗。

葛根

芍藥

知母

各半兩

川芎

一兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片蔥白三寸煎至七分去滓熱服出汗如有汗溫服加甘州

治小兒夾驚傷風并治發瘧頭痛加石膏服嘔
者加半夏

知母麻黃湯

治傷寒差後或十數日或半月二十日終不惺
惺常昏沉似失精神語言錯繆又無寒熱醫或
作鬼祟或作風疾多般治之不瘥或朝夕潮熱
煩亦或有寒熱似瘧都般發汗不盡餘毒心胞
絡間所致

知母

麻黃

去節

甘草

炙

芍藥

黃芩

各半

桂枝

去皮半兩盛暑可減半

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃氣和卽愈未汗須再服大小加減

癰毒腫痛 第九十三問

湯氏云此四者皆由血氣凝滯而有熱毒之氣乘之
故結聚成癰。癰腫毒也。備急神驗方未結之初微見
有頭紅痛起隱痛者急用不語唾夜半頻頻塗之卽
消散。若已結成當用天烏散貼方治小兒癰瘡驚毒
癰腫皆可服。漏蘆散真良方也。熱甚者青解毒丸四
順清涼飲加防風連翹玄參劑亦可服。五福化毒丹
尤良。連翹湯可服。青露散掩之。畱小孔後用驚毒掩
子收瘡口取効。熱甚者涼膈散亦可服。

天烏散貼方

天南星 赤小豆 草烏 黃蘗

右等分爲末。生薑自然汁調貼患處。用米醋調

尤佳。

漏蘆散

治小兒癰瘡及丹毒瘡癰

漏蘆

麻黃

去根節

芒硝

連翹

黃芩

川升麻

甘州

各二錢半

川大黃

炒

兩

白歛

七錢半

右剉散每服二錢米一盞煎五分去滓量大小
加減不拘時候加減溫服可加羌活荊芥川芎
防風枳殼。

青解毒丸

治證詳見九十問

寒水石

石膏

研各
八兩

青黛

四兩

右研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調丸如芡
實大每服一九食後新汲水化下或細嚼生薑
湯下亦得如中諸毒並宜服及小兒驚風潮熱

痰涎壅塞心胸煩燥頰赤多渴坐臥不穩每三歲兒可服半粒量大小加減

玄參劑

解諸般熱消瘡癰

生地黃

玄參

各一兩

大黃

煨半兩

右爲末煉蜜九桐子大每服十九煎燈心竹葉湯化下入沙糖少許亦可加羌活川芎芍藥連翹防風

又方

治疹痘後餘毒不散。遍身生瘡不已。大能解毒。

玄參

赤芍藥

生地黃

赤茯苓

荊芥

防風

木通

桔梗

黃芩

朱砂

青黛

各等分

右爲細末。煉蜜丸。芡實大。每服一九。薄荷湯下。
太寒加減服之。

五福化毒丹

治小兒蘊積毒熱。驚惕狂躁。頰赤咽乾。口舌生
瘡。夜臥不寧。謔言煩燥。頭面身體多生瘡癰。

玄參

桔梗

各二兩

茯苓

二兩

人參

牙硝

青黛

各二兩

甘州

七錢

麝香

一字

金箔

銀箔

各十片
為衣

右為末煉蜜和劑如芡實大每服一九薄黃湯

下不拘時及治瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭

氣以生地黃汁化下一九及用雞翎刷在口內

連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癰丹毒腫風

連翹

瞿麥

荊芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

活石

蟬蛻

甘艸

炒各一錢

山梔仁

黃芩

各半錢

右剉細每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大黃

更詳證加減爲佳

青露飲

治背疽一切惡瘡圍藥不胤開

白芨

白欬

白薇

白芷

白蘚皮

朴硝

青黛

黃蘗

大黃

天花粉

青露葉

即芙蓉葉

老龍皮

即老松木皮各等分

右為細末。生薑自然汁調塗。留小孔。如乾再用

生薑汁潤

驚毒掩

一治瘡癰初發。掩上即退。已成速破。

蔥根

七箇

木別

七箇

白芷

二箇

巴豆

十四箇

黃丹

二兩

油

四兩

右先用油入前四味。武火熬用柳木篦攪。以白

正焦黑爲度用綿濾去滓再入銚用文火熬却
入黃丹熬令紫黑色成膏爲度治諸般瘡癩去
膿收瘡口

驚毒諸般腫痛淹子

蒲黃

大黃

黃蘗

真粉

連翹

白芷

白芨

白歛

牡蠣

丹參

右爲末水調塗腫處

涼膈散

治小兒腑臟積熱煩躁多渴頭昏唇焦咽燥舌
腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實不
利涕唾稠粘睡臥不寧譫語狂妄腸胃燥結便
溺赤澁一切風腫竝宜服之。

川大黃

朴硝

甘艸

炙各一兩

連翹

二兩

梔子仁

黃芩

薄荷葉

去土各半兩

右剉散每服二錢水一盞入竹葉七片蜜少許
煎四分食後溫服大小加減。

惡核瘰癧

第九十四問

巢氏云小兒惡核者乃風熱毒氣與血氣相搏結成
頑核生於項頸遇風寒所折不消結成瘰癧久而潰
膿成瘡者也凡有此證宜服清涼飲子及升麻湯等
藥湯氏貼惡核瘰癧各有妙方千金連翹丸千金龍
膽湯皆可服之

清涼飲子

治證詳見四十問

大黃

連翹

芍藥

羌活

當歸

防風

甘州

山梔仁

各等分

右爲飲子每服一大錢水半釐煎三分去滓不拘時候

連翹丸

治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結核瘰癧及腸脇背裏有堅核不痛多爲結風氣腫

連翹

桑白皮

白頭翁

牡丹皮

防風

黃蘗

桂心

香豉

獨活

秦艽

各半兩

海藻

二錢

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九或二十九燈心湯下。

千金龍膽湯

治證詳見第三問

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

各木 蠅蚋 二枚去 銖 且炙

甘艸

六銖直 指半兩

大黃

二兩煨直 指二錢半

右十味咬咀以水一升煮取五合爲劑也服之

如後節度藥者有虛實藥宜是數合水也兒生

男婦
一日至七日分一合爲三服。兒生八日至十五
日分一合半爲三服。以漸加服。皆得下卽止。勿
再服也。直指方爲末。每服一錢。北棗煎服。或加
防風。麥門冬。以導心熱。黃芩減半。去蟻蛭亦可。
大聖散

治瘰癧。消風毒。腫上壅。內熱多。生癰疹。風丹風
證。食煎燂多。致此疾。

羌活

荊芥

升麻

薄荷

防風

甘草

大黃

黃芩

玄參 各等分

有各等分爲末。每二錢水二盞煎六分。溫服。又方用牡蠣二兩火煨爲末。玄參一兩。甘艸半兩。爲末。每二錢清茶調下。

槲皮散

治嬰童小兒解癰癰作疼痛。

槲皮

去粗皮此樹在處處有卽包槲皮葉也

若不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗。

白薇散

治癰癰濃汁不乾

白芨

貝母

去心各五錢

輕粉

二錢

右爲細末。先用棚皮散洗。過後用清油調傅。

發斑 第九十五問

有問云發斑有兩證有溫毒發斑有胃爛發斑也溫毒發斑者爲冬月溫煖人感華火之氣未卽病發至春或被積寒所折毒氣不得泄一天氣暄熱溫毒始發則肌內斑爛癢疹如綿紋其用葛根橘皮湯黃連橘皮湯主之若胃爛發斑者爲寒未下卽發斑下早亦發斑蓋不當下而下之熱氣乘虛入胃當下失下則胃熱不得泄所以皆發斑也凡發斑不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增斑爛表虛

故也。玄參升麻湯化斑湯主之。傷寒發斑只是熱氣在臟腑。先攻腸胃裏蘊成瘡。方發出外。赤者易治。黑者難治。蓋毒氣入胃之深故也。羌活散加蟬退治斑亦可。

葛根橘皮湯

治冬溫未卽病。春被積寒所折。不得發泄。至天氣暄熱。其溫毒始發。肌中斑爛癰疹如綿紋。咳嗽心悶。但嘔吐清汁。服此藥卽靜。兼治小兒痘豆瘡。

葛根

陳皮

杏仁

去尖

麻黃

去節

知母

黃芩

甘艸

各半

右剉散。白水煎。有熱不吐。去陳皮。冷。證去黃芩。

知母

黃連橘皮湯

治溫毒發斑。兼治癰證。泄瀉并去血。

黃連

一兩

陳皮

杏仁

去尖

枳實

炒

麻黃

去節

葛根

各半

厚朴

象

甘艸

炙各一錢半

右剉散。每服二錢。白水煎服。亦治煩渴。或不用。

厚朴甘草

人參升麻湯

治傷寒發汗吐下後毒氣不散表虛裏實熱潑于外故身斑如綿紋狀甚則煩燥譫語兼治喉閉腫痛

玄參

升麻

甘草

炙各半兩

右剉散每服二錢水一盞煎六分去滓服又煎升麻湯內加玄參亦可

化斑湯

人參

石膏

姜蘇

知母

甘艸

各二錢半

右剉散每服二錢水一盞入糯米半合煎六分
米熟爲度溫服

羌活散

川羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

白茯苓

桔梗

枳殼

人參

地骨皮

天麻

各等分

甘艸

減半

右咬咀生薑薄荷煎加蟬蛻治驚熱

丹毒赤遊腫

第九十六問

仲陽云。熱毒之氣客于腠理。搏于血氣。發于外皮。上赤如丹。熱毒與血相擊。而風氣乘之。所以赤腫遊走而遍體也。此由乳母食酒麪煎炙過度。與夫烘衣與兒不候冷而卽穿著。多成此證。或潑于頭面胸背。令兒燥悶。腹脹如火之熱。痛不可言。有入腹入腎之證。便不可救。又方小兒一週之內。皮毛肌肉筋骨髓腦五臟六腑榮衛血氣皆未堅固。譬如草木萌芽之狀。未經寒暑。嬌嫩軟弱。今嬰孩稱爲芽兒故也。一週之

內切不可頻頻洗浴。恐濕熱之氣鬱蒸不散。遍身生赤遊丹毒。俗爲之癰。片片如胭脂塗染。皆腫而壯熱。若毒入腹者。則腹脹硬氣。以致殺兒。此因洗浴而得也。若肌肉寬緩。腠理開泄。包裹失宜。復爲風邪所乘。而身生白癰。皆腫而壯熱也。或增寒壯熱。鼻塞腦悶。或上氣痰喘。咳嗽吐逆。種種之疾。皆因洗浴脫著而得也。治赤癰丹毒。可用小刀子疏去癰頭。赤暈惡血。毒汁。次以米黃散。葛根白朮散。惺芳散。主之。敗毒散。及升麻湯。防已散。皆可選而用之。又丹熱實熱。龍帶。

並用大連翹湯加大黃及燈心煎服殊驗

冰黃散

土消

大黃

細末各二條

右二味相合新汲水調攪勻用雞羽蘸藥塗刷

毒上

葛根白朮散

治赤白丹腫毒

白朮

二錢

茯苓

去皮二錢

木香

甘草

各二錢

芍藥

枳殼

各三錢

枳殼

去穢二錢

枳殼

五分

右劉散每服三錢水一盞煎七分去滓熱服

惺芳散

治赤遊腫不可服冷藥

蘇合

去心

白朮

人參

甘艸

枳殼

細辛

去前

川芎

各等分

右劉散每服三錢水一盞煎七分去滓熱服

敗毒散

柴胡

去心

前胡

川芎

枳殼

炒

羌活

獨活

茯苓

桔梗

炒

人參

各一兩

甘草

半兩

右爲末。每服二錢。生薑薄荷煎加地骨皮天麻
或咬咀加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛黃
芩無汗加麻黃。

防風散

治丹毒候乃熱毒之氣與血相搏而風氣乘之
故赤腫及遊走遍體者又名赤遊風入腹入腎
則殺人。

漢防己

半兩

朴硝

犀角

黃芩

黃芪

川升麻

各二錢半

右剉散加竹葉煎大小隨病加減一方去朴硝有澤瀉。

白玉散

治赤遊丹毒

滑石

寒水石

各一兩

右爲末米醋調傅患處或腫至外腎者破爛只

用水調

大連翹湯

連翹

瞿麥

荊芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

活石

蟬蛻

甘艸

炒各一錢山梔子

黃芩

各分

右剉細每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大黃
更詳證加減迺妙

消毒飲

水煎

治丹毒

兩

已出毒氣壅遏壯熱狂躁睡臥不

安太便秘澁咽喉腫痛胸膈不利痘疹消破却

可服之。

牛旁子

炒二兩

荆芥穗

甘草

炙各半兩

右剉散水煎自利及瘡痘未破不可輕服或加
防風連翹升麻蟬退赤芍藥有熱加黃芩防風
犀角消毒飲

瘡癬

第九十七門

湯氏云小兒傷濕血氣壅滯則生瘡多由父母舛怒
于不好潔淨衣襦不與頻換洗濯或尿屎穢汚連日
不洗亦能浸漬而成瘡天氣溫和頻與澡洗更衣多
曰外宣亦不須服藥小兒不得已而服藥此迺下策
將養合宜何病何段更令乳哺有節勿令過飽其身
乃如蔣樹此調養之理也浴方春用柳條荆芥夏用
桑葉槐枝秋冬用苦參頻浴身安外宣無病金華散
又傳瘡癬等方皆可用也摩風膏傳瘡癬極妙兼服

羌活散加防風荆芥及大連翹飲升麻湯等劑。

金華散

治乾濕癩瘡

黃丹

散

輕粉

一錢

黃蘗

黃連

各半兩

麝香

少許

右爲末先洗次乾搽之如乾癬瘡用臘用猪脂和傅如無用麻油亦可加黃芩大黃

寧風膏

治小兒遍身疥癬癢痒

苦參

瀝青

無灰

地

黃

各一錢

巴豆三粒輕粉五分

去殼

全蠟二枚

麻油二兩

右用麻油煎至巴豆焦濾去所煎物入輕粉和

勻傳瘡疥效

一方

治惡癬以紫貝草根生白礬少許同搗爛塗患處兩次可斷根

又方

用砒少許滴醋同熬爲膏塗之

又方

以肉揣去頭足糯米炒黃去米以淮棗煮熟去

羌活散

川羌活 獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘艸 減半

右咬咀生薑薄苽煎加蟬蛻治驚熱

大連翹湯

連翹 瞿麥 荊芥 木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

活石

蟬蛻

甘艸

炒各一錢

山梔仁

黃芩

右剉細每服一錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃更詳證加減為佳

升麻湯

升麻

葛根

白芍藥

甘艸

各等分炙減半

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服服藥身涼即止加紫蘇陳皮香附子各升散

有熱加黃芩咽痛加桔梗發斑丹毒加玄參乃效。

癰瘡 第九十八問

巢氏云。夫小兒癰瘡者。爲風熱毒氣所乘。搏於皮膚。乃生癰漿。潰而成瘡。故名曰癰瘡也。湯氏牛黃散淋洗方治之。又有癰疽之發。有數種。先作點而後露骨。小者如粟。如豆。劇者如梅。如李。赤黑青白。色變不常。或生口齒。或肚臍。或臂臂。發無定處。大槩多見於手指之間。根深入肌。走質遊腫。毒血流注。貫串筋脉。爛肉見骨。出血極多。令人狂言煩躁。噯悶。皆毒氣攻心之候也。南星半夏白芷末傳之。用藥先洗而後傳之。

甚佳其諸藥理推廣難近法度行之皂角血餘等藥尤佳

牛黃散

牛黃

龍腦

丹砂

各一分

鉛霜

半兩

太陰玄精石

一兩

右爲末每服半錢先於腫處鍼破出血鹽湯拭口了搽藥口內

三黃真珠散

治疳積壯熱生

以淫瘡俗呼爲瀉膿水漬處便

濕爛成瘡此證當內服消食退疳之藥後用此

松香

五味子

黃連

黃丹

海鯉鱗

各三錢

輕粉

雄黃

各少許

右七味並為細末。瘡乾則以香油調傅。濕以乾
搽。先以瑩肌散煎洗。然後用此藥。

瑩肌散洗瘡

赤芍藥

防風

苦參

薄荷

甘草

身

劉寄奴

黃蘗

右等分煎湯洗去患處宿膿。後以前三黃散末

轉錄上三二度卽戒茹而愈者只服化毒丹

麻症水痘 第九十九問

湯氏云。凡小兒斑瘡之候。乃天行時氣熱不能解。蘊積於胃。而胃主肌肉。毒氣薰發於肌肉。狀如蚊子所嚙。乃成斑毒也。赤者十生一死。黑者十死一生。此症與斑症不同。發斑乃如錦紋有空缺處。如雲頭之狀。麻症乃遍身無空缺處。但疎密之不同。分輕重耳。黃連杏仁湯治嬰孩受邪熱甚作底麻疹之症。其瘡漸出咳嗽煩悶。嘔逆清水。眼赤咽喉口舌生瘡。宜服此以解之。又有黃芩知母湯治小兒麻症。催出得瘡斑。

爛癰疹如錦紋或白膿者腥臭不能乾心胸咳悶嘔吐清水身體溫熱不時宜進此以治之起初疑似之間可服升麻湯頭痛熱甚者可服柴胡升麻湯化斑湯羌活散蟬退散皆可又有發熱一二日而出水泡卽消者名爲水痘但用輕劑解之卽便痊可羌活散升麻消毒飲主之麥煎散亦可服又可服大連翹湯以解利之活人書黃連橘皮湯治溫毒發斑可治出麻作瀉服此下利當先止與黃連杏仁湯同但多製厚朴甘艸耳

麻症宜服麻黃湯表

斑症可下不可表

痘症表下俱不可

黃連杏仁湯

治孩童受邪熱候作成麻痘之症其瘡漸出咳嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽喉口舌生瘡作瀉

黃連

陳皮

杏仁

去皮尖炒

麻黃

去節

枳殼

去穢 薑根 各半兩

右剉散每服二錢水煎服作瀉者加厚朴甘草

黃芩知母湯

治小兒五臟邪熱，作成麻症，瘡色癢爛，癰疹如錦紋，或白膿水腥臭不乾，心胸閉悶，嘔吐清水，身體溫壯，不時宜服之。

葛根

陳皮

杏仁

去皮

麻黃

去節

知母

黃芩

甘草

各半

右剉散，每服二錢，水一盞，煎半盞，去滓服，不嘔逆，去陳皮，加芍藥，如吐則用之。

升麻湯

治小兒時行瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹
已發未發疑似之間及傷寒傷風頭痛憎寒壯
熱肢體疼發熱畏寒鼻乾不得睡兼以寒暄不
時人多疫癘乍暖脫着及暑熱忽變陰寒身體
疼痛頭重如石者可加柴胡無汗加麻黃

升麻

葛根

白芍藥

甘艸

炙各
等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服
服藥身涼卽止加紫蘇陳皮香附子各升蘇散
有熱加黃芩咽痛加桔梗發癰丹毒加玄參散

柴胡升麻湯

與前升麻湯同

化斑湯

人參

石膏

姜棗

知母

甘草

各二錢半

右剉散每服二錢水一盞入糯米半合煎六分
米熟爲度溫服

葱活散

川羌活

川獨活

前胡

柴胡

川芎

白茯苓

桔梗

枳殼

人參

地骨皮

天麻

各等分

甘草

右咬咀生薑薄荷煎驚熱加蟬退。

蟬退飲

釣藤

天麻

茯苓

川芎

白芍藥

各二錢

甘草

蟬退

右咬咀燈心煎加水通麥門冬防風羌活

各錢

消毒飲

牛旁子

炒二兩

荆芥穗

甘艸

炙各半兩

右剉散白水煎自利及瘡痘未破不可輕服或

加防風連翹升麻蟬退赤芍藥有熱加黃芩防
風犀角消毒飲

麥煎散

滑石 地骨皮 赤芍藥 石膏

白茯苓 杏仁 知母 甘艸

葶藶子炒 人參各半兩 麻黃去節一兩半

右爲末。每服一錢。麥子煎湯調下。如小兒生牙兒
感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼。每一字用麥子
煎湯調下。一方去地骨皮滑石。加羌活川芎薄

原缺

瘡疹

百問

仙陽云瘡疹候面燥腮赤目胞赤呵欠頓悶午涼午
熱咳嗽嚏噴手足稍冷夜臥驚悸多睡煩躁發熱臉
赤唇紅身痛頭疼痰涎傷寒症類有之並瘡疹症此
天行時氣之病始發之時因傷風傷寒而得者有因
時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲
驚怒蓄血而得者或爲霍亂牙驚搐如風之症或
爲口舌咽喉腹肚疼痛之狀或爲煩躁發熱臉赤狂
悶昏睡識語之形或自汗或下利或發熱或不發熱

症候多端卒未易辨。方論所載以耳冷、骹冷、足冷驗之。蓋謂瘡疹屬陽。腎臟無證耳與骹足俱屬于腎。故腎所部獨冷。然疑似之間。或中或否。不若視其耳後有紅脈赤縷者爲真。于此可驗其脈洪大而弦數。診脈之際。身略戰動。是症也。調護之法。首尾俱不可汗。下。但溫涼之劑。兼而濟之。解毒和中。安表而已。凡熱不可驟遏。但輕解之。若無熱則瘡又不能發也。虛者益之。實者損之。冷者溫之。熱者平之。是爲權度。借喻而言。亦如庖人籠蒸之法。但欲爲鬆耳。如苟妄汗。則

開轉增瘡。如苟妄下。則正氣內脫。變而歸
腎。身體振寒。耳聾反熱。眼合肚脹。其瘡黑壞十無一
生。舌黑者尤難療。何者。隨瘡五臟見症。未發則五臟
之症悉具。已發則歸於一臟受毒。多者見之。故肝臟
水疱。淚出如水。小而疱青。肺臟膿疱。其涕稠濁。色白
而大。心臟發斑。血疱色赤。而小。脾臟發疹。色黃微赤。
有小斑瘡。惟歸腎則變黑。青紫乾陷。瘡疹屬陽。本
無腎症。腎在腑之下。不受穢毒。故無疰陽取火也。腎
取水也。以火用事。為水所製。豈不殆哉。朱氏云。瘡疹

已發未發。但不可疎轉。此爲大戒。瘡疹首尾皆不可下。及輒用利藥。毒氣入裏。卽殺人。以此觀之。瘡疹症狀。雖與傷寒相似。而疹痘治法。實與傷寒不同。傷寒所傳從表入裏。痘疹所發從裏出表。蓋毒根於裏。若下之內氣一虛。毒不能出而反入焉。由是土不能勝水。黑陷者有之。毒發于表。若汗之則榮衛一虛。重令開泄。轉增瘡爛。由是風邪乘虛變症者有之。汗下二說。古人之所深戒也。調解之法。將如何。曰活血調氣。安表和中。輕清消毒。溫涼之劑。二者得兼而已。濕如

黃耆當歸木香輩涼如前胡乾葛升麻輩佐之以川
芎芍藥枳殼桔梗羌活木通紫草甘艸之屬則可以
調適矣。凡小兒覺身熱症似傷寒。但未經瘡痘疑似
未明。且與惺惺散參蘇飲抱龍丸升蘇散熱甚則先
與升麻湯或加川芎紫蘇茯苓嘔吐者香蘇飲加半
夏茯苓白芍藥泄瀉者香蘇飲加白朮茯苓吐瀉胃
虛者陳氏木香散渴者升麻湯加紫蘇茯苓發搐及
譫語熱甚者至寶丹抱龍丸和服瘡疹未出透者可
服如出已透膚者不可服也。或用防風天麻丸亦可。

如一二日疹出紅點如麻子大小不一等者輕一齊
竝出蜜甚者重竝服四聖散及泄瀉者紫草木香湯
或四君子湯加木香丁香如冷戰出不透者加官桂
有驚熱出未透者快斑散治之內有蟬退者也三四
日瘡疹出不快者四聖散皮膚冷者加木香肉桂更
須活血散溫酒紫草湯調下以助藥力則出快如欲
止痛用溫熱水調下如紫色黑陷內熱者大便秘者
用龍膽膏猪心血辰砂腦子研細木香湯調下可也
或用猪尾膏亦可如內無大毒不可輕服也常用胡

姜酒噴幃帳及身上爲佳。不可貴而以辟惡氣耳。
又燒蒼朮降真香亦佳。五六日痘瘡熾甚但服芍藥
甘草湯定痛多服不妨。却服甘露飲數服。或口內有
膿瘡咽喉腫痛不能乳食者並皆治之。七八日瘡熾
透略爛方可服地黃湯。大便秘者可服消毒飲。凡痘
根窠紅活光澤明淨者輕。如損陷稠密灰白色瀉渴
者重。無熱者可服四物湯。用麥門冬防風蟬退等劑。
九日十日有熱甚可服犀角地黃湯消毒飲便利者
不可服。小便不通者大連翹湯加減服以小便利爲

度導赤散羌活散皆可服。熱甚者小柴胡湯。渴甚者
白虎湯。太便秘甚數日不通者宜風散。一服便可開
服前藥。痘瘡長足肥滿蒼膿色者輕寒戰慄。腹脹
煩渴喘急咬牙者重。十一日十二日痘瘡當靨。瘡漸
欲落而欲愈也。若痘瘡未靨之間或不能靨或腹脹
煩渴或泄瀉氣促者不可與蜜水瓜菓等冷物食之。
卽死。當與木香散異功散加減服之。凡小兒先發搐
而後發瘡者生。如瘡已瘥而後發搐或吐或瀉者死。
先發熱而後出瘡者存。瘡已發而後泄不止者亡瘡。

瘥而忽瀉膿血。痂皮者順腹中有瘡也。瀉血而水穀不消者逆脾胃虛也。或瀉血而瘡壞無膿者亦不可救胃爛也。要知陽明主肌肉胃氣不可一日不强也。凡出瘡疹生須護眼。或用辰砂或用胭脂以塗眼眶。內有紅花以活血爲妙。如痘瘡入眼宜與決明散紫貝散瘡癰。落不落則用酥油或白蜜時時潤之。可揭則揭去。若失潤揭遲。痂才硬則成癰痕。仍用滅癰藥傳之。切不可與雞鴨卵與食。食則卽時目盲瞳子如卵白色。其應如神。亦不可再食豬肉。不可不戒也。

中間錢氏有百祥丸下之及有用人牙齒之藥切不可輕服甚以爲戒也不若用獨聖散與牛李膏爲愈或痘瘡已發爲風冷所傷榮衛不和或爲宿食所傷內氣壅遏以致冰硬者調解散主之如瀉不止用參朮白朮散加水香可也四君子湯加水香豆蔻亦妙雖然瘡黑本爲惡症治之有方猶有幸而生者至於調衛之際乳母不能謹口流毒於小兒或粥食乳哺不時使之饑虛或衣被不周致傷風冷以致閨房有外邪有犯則亦冰硬變壞而歸腎自我致寇又誰

各耶能調衛者以溫散湯劑釀乳飲之謹護風寒使
之氣體通和其於粥餌則勿令飽而氣實饑而氣虛
斯爲得矣然瘡曰聖瘡七日熱而發七日庖而乾又
七日平復如 矣若實實虛虛損不足而益有餘則
瘡出甚難如調順血氣溫和平胃均平冷熱則瘡出
甚易調解之法無逾於此故備論之疹症初感未出
而發熱者扁鵲油劑法治之則出疹甚稀或卽消解
而瘡疹不發者有之自然解散而安泰必矣

惺惺散

天花粉

人參

細辛

去葉

白茯苓

去皮

白朮

甘草

炙

桔梗

各等分

右件同样。羅爲末。每服一錢。水一小盞。入薄荷

三葉同煎至四分。溫服。如要和氣。卽入生薑煎

服不拘時

參蘇飲

陳皮

半夏

茯苓

甘草

炙

桔梗

乾葛

前胡

枳殼

木香

等

右剉散水煎服

抱龍丸

牛膽南星

一兩

天竺黃

五錢雄黃

辰砂

各二錢半

麝香

少許

氣喘有痰加枯礬

右為末。煮甘艸汁丸如芡實大薄荷化下。

升麻湯

升麻

葛根

白芍藥

甘艸

各等分炙減半

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服服藥身涼即止。加紫蘇陳皮香附子名升蘇散

有熱加黃芩。咽痛加桔梗。發斑丹毒加玄參。效。

升蘇散

治小兒出疹發熱。疑似之間。以此解之。

升麻

葛根

赤芍藥

紫蘇

茯苓

川芎

甘艸

各等分

右剉散。白水煎服。如嘔者加半夏。茯苓。白芍藥。

生薑煎

香蘇散

治小兒出疹症作瀉。

香附子 陳皮 紫蘇 川芎

甘草 白芷 各等分

右劉散生薑蔥白煎或白水煎瀉症加白朮茯苓

苓嘔症加茯苓白芍藥

木香散 治疹痘冷症

木香 二錢 前胡 去蘆 訶子肉 陳皮

丁香 官桂 去皮 大腹皮 人參

半夏 甘艸 赤茯苓 各三錢

右劉散每三錢水一盞煎六分去滓帶熱空心

服量大小加減藥性溫平扶陰助陽治腹脹瀉
渴如虛加糯米一撮黃耆三錢同煎

至寶丹

生犀屑

生玳瑁屑

琥珀

研

朱砂

細研水飛

雄黃

細研水飛各一兩

金箔

三十片為衣

銀箔

五十片研

片腦

一分研

麝香

一錢研

牛黃

半兩研

安息香

兩半為末以無灰酒飛過濾去砂石約取一兩慢火熬成膏

右生犀屑玳瑁搗羅為細末研入諸藥令勻將

安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入

少熟蜜盛不津。晬中旋丸如桐子。大二歲兒服二丸。人參湯化下。大小以意加減。又治大人卒中不語。中惡氣。中諸物毒。中熱。胎風。產後血暈。死胎不下。並用童子小便一合。生薑自然汁三五滴。同溫過化下。五丸立效。

四聖散

治小兒痘子已透。皮膚未透。用此藥發痘。

紫草

木通

黃耆

甘艸

枳殼

各等分

右剉散煎服得痘嫩却任服且服芍藥甘艸湯
甘露飲

加味四聖散

治痘出不快及變陷冷症迺可

紫草

木通

木香

黃芪

川芎

甘艸

右剉散每服三錢水煎不拘時服大便秘澀加
枳殼少許大便如常加糯米百粒解毒能釀而
發之

紫草不香湯

治痘疹出不快大便洩利

甘艸

炙少許

紫艸

木香

茯苓

白朮

各等分

右入糯米煎。蓋些艸能利大便。木香白朮所以佐之也。

四君子湯

人參

去蘆

茯苓

去皮

甘艸

白朮

各等分

右爲末。每服三錢。水一盞。七分通口服。不拘時。

白湯點服溫和脾胃進益飲食辟寒邪
瘴霧氣

快斑湯 治瘡疹不快

紫艸

蟬退

人參

白芍藥

各

木通

一錢

甘艸

炙五分

右剉散每服三錢煎服。

活血散

治痘疹出不快

白芍藥

為細末每服一錢以溫酒調服如欲止痛用

溫熱也

龍腦膏

治時疾發碗豆瘡及赤瘡子未透心
喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜
爾毒氣入臟必死。

生龍腦 一錢

右研細旋滴猪血和丸如芡實大每服一
頰狂躁者用紫艸湯下。若瘡子陷伏者用迴
下少時心神便完得睡痘瘡發透依常將息

取安也

猪尾膏

治瘡子倒靨心神不安用小猪尾尖刺血一兩點入生腦子少許同研用新汲水調下立效入辰砂一錢木香湯調下亦妙

胡荽酒

治痘瘡初發時可服遶房噴之以辟穢惡之氣

胡荽 一兩

右細切以酒三大盞煎數沸從項以下含酒噴

之背脊胸腹及兩脚通勿噴面

芍藥甘草湯

治出疹肚疼腹滿小便不通

淮芍藥

一兩二錢

甘草

半兩

右咬咀水煎服

甘露飲

熟地黃

麥門冬

去心焙

枳殼

去穢炒

甘草

山茵陳

枇杷葉

炮去毛

石斛

去蘆

黃芩

去心

生地黃

天門冬

各等分

右劉散每服三錢水一盞煎七分去滓食後臨

臥溫服小兒一服分作二服仍量歲數加減服

犀角地黄湯

犀角屑

如無以升麻代之

牡丹皮

去骨各一兩

生地黃

半斤

芍藥

七錢半

右劉散每服三錢水一盞服

消母飲

牛蒡子

炒三兩

荆芥穗

甘草

炙各半兩

右劉散白水煎白利及瘡痘未破不可輕服或

加防風連翹升麻蟬退赤芍藥有熱加黃芩
風犀角消毒飲

加減四物湯

治痘瘡入目或瘡收後

當歸

芍藥

川芎

蒼朮

白菊花

乾葛

羌活

各等分

右剉散每服二錢水一盞煎服

大連翹湯

連翹

瞿麥

荆芥

木通

藥性論卷之十一

至

赤芍藥 當歸 防風 柴胡

活石 蟬蛻 甘艸 山梔子

黃芩 各五分

右咬咀每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大黃更詳症加減為佳

導赤散 治心驚內虛邪熱

生地黃 甘草 木通 各等分

右咬咀竹葉煎加黃芩芍藥葱活燈心煎服

活散

川羌活 川獨活 前胡 紫蘇

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘草 炙

右咬咀。生薑薄荷煎加蠅蛻治驚熱。

小柴胡湯

人參 去蘆 甘草 炙 黃芩 一錢 柴胡 二錢

半夏 湯泡七次焙乾二錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎

去滓溫服不拘時

東華書局影印 卷十 三

白虎湯

知母 三兩 甘草 一兩 石膏 八兩 粳米 三合

右剉散每服三錢水一盞煎至六分米熟為度

去滓溫服聖惠方乾葛

宣風散

治風痰壅盛或大便緊澁肚急諸般疳氣肚急

驚風痰潮皆可服熱症伏秘並宜服之此乃宣

利之藥

檳榔 一箇 陳皮 去白半兩 二錢

黑牽牛

四兩半
生半炒

右爲末食前蜜湯調下一服。

異功散

治小兒出疹冷症。此藥能除風寒濕痺。調和陰陽。滋養血氣。使痘瘡易出。易靨。不致痒塌。

木香

當歸

人參

陳皮

厚朴

丁香

肉豆蔻

各二錢
五分

桂

茯苓

白朮

各二錢

半夏

附子

各一錢

右劉散每服二錢水一盞薑二片棗三個煎六分去滓稍熱服出疹瀉不止冷者可服

決明散

治小兒疳疹入眼

括蕒根

二錢

決明子

赤芍藥

各一錢五分

甘艸

一錢

右搗羅為末每服半錢水調下日二服。

紫貝散

紫貝

一個生用即研碎也

右為末用羊子肝批開摻藥末一錢線經米泔

煮熟入小瓶內盛乘熱熏候冷取出用下
一宿空心服。

韶粉散

治小兒痘疹纔愈而毒尚未盡盡癰腫落其
猶黯或凹或凸肉起當用此塗之。

韶粉

一兩 輕粉 一錢

右爲末入豬脂油調勻塗瘡癰上欲落不落當
減癰痕或用羊骨髓一兩入輕粉一錢研成白
膏塗瘡上如痘瘡全好如痒甚俱搔成瘡癰不

落用上等蜜塗之其瘡痂落亦無赤黑癰痕最
為神妙

獨聖散

治痘瘡陷入不發色黑而氣欲絕當服此漸蘇
紅潤

穿山甲

湯洗淨炒令
焦黃色甲

右為末每服半錢入麝少許南本香湯調下或
紫艸煎湯入酒少許調下

十李膏

又名必勝膏

牛李子

不以多少一名鼠李子牛諸子楮李烏罌子隨地呼其名

右取汁石器中熬成膏牛李野生道邊過秋結實黑圓成穗或無生者市肆中買乾者爲末水熬成膏每服皂子大煎杏仁湯化下

調解散

治痘瘡已發或爲風冷所折榮衛不和或爲宿食所傷內氣壅遏以致冰硬並主之

青皮

陳皮

桔梗

枳殼

炒

半夏

川芎

木通

乾葛

藥譜卷之十一 雜藥 五

甘艸 紫蘇 各等分 人參 減半

右剉散每服二錢薑棗煎服。

參苓白朮散

白扁豆 一斤半 薑汁 浸去皮微炒 人參 去蘆 白茯苓

白朮 甘艸 炙 山藥 各二斤 蓮肉

桔梗 薏苡仁 縮砂仁 各一斤

右為細末每服二錢棗湯調下小兒大小加減

扁鵲調油法

治小兒發熱恐成痘癰以此止之。

生麻油

童便

各半

右逐旋夾和以柳枝攪令如蜜每服二蜺殼許服畢令臥少時但三四服大小便利身體熱退卽不成瘡痘之症若形迹已露則不可服也

又方

治小兒臍臍伏熱未成疹子疾候四肢微覺有熱食物似減頭髮乾直或時額上微熱宜生油湯劑法扁鵲及倉公用謂之神劑

生油

一蒸

右冷如人體溫將熟水一盞旋旋入油盞內不住手以筋打攪候入熟水盡令勻如蜜卽止夜臥時服三歲至百晬兒每服二蜆殼許十五歲每服三大蜆殼許五歲至七歲每服三蜆殼直至大人服五蜆殼或三大合每日飲後良久與服服畢令臥少時如三五服大小便利四肢熱退則疹痘不復發當自安也。

又方以手蘸麻油摩其背脊間直至尾骨亦驗也。

紫艸木通湯

治瘡疹出不快

紫

人參

糯米

各等分

甘艸

減半

右剉散每二錢煎服內虛大便利下入南木香

去紫艸

蠟退膏

禦風邪辟惡氣透肌表快瘡疹

蟬退

當歸

防風

甘艸

川芎

荆芥穗

升麻

各等分

加芍藥

右爲末煉蜜丸芡實太每服一九煎荆芥湯下

安斑散

升麻

赤茯苓

黃芪

羌活

人參

枳殼炒

桔梗

甘艸

各半兩

右剉散每二錢紫草少許薄荷一葉煎溫服

如聖麥門冬湯

治小兒瘡疹毒氣上攻咽喉口舌生瘡故不能

吮乳

桔梗

牛蒡子

炒

麥門冬

去心

梔子

各半兩

右剉散每服二錢淡竹葉煎服活人書云為末

太和散

服二匙沸湯調細細呷入口內

治小兒瘡疱及傷寒時氣病後餘邪不

生地黃

當歸

人參

地骨皮

赤芍藥

甘草

各等分

右剉散每二錢白水煎服

去瘡疹癰方

蜜陀僧

右爲細末水調塗甚妙

龍膽丸

治小兒五疳潮熱面色痿黃乳食遲化日漸羸瘠虛弱

龍膽

蘆薈

肉豆蔻

煨

黃連

木香

神麴

麥蘖

炒各等分

亦可檳榔史君子加入

右末麴糊丸如黍米八三二十九溫米飲送下

黃連加胡黃連柴胡辰砂六六六蘆薈肉豆蔻

五疳潮熱

積散 治諸癰毒

百艸霜 炒 雷光

蕪荑

錢 各三

巴豆

去殼一兩淨去
心膜不去油

右為末。飯上飯丸。如粟米大。一方黃丹末。每服

一丸。空腹米飲下。一方青黛末。每服一丸。空心

米飲下。

治嗽含膏方

蔓藤

炒微焦

知母

貝母

各一兩為末。二味同巴
豆七粒炒去巴豆不用

右先將葶藶子搗成膏次入二味以棗肉半兩
搗勻入沙糖同糊如芡實大每一丸綿裹嚥津
甚者三丸

齒疳膏

山梔

十五个
炒存性

雌黃

辰砂

輕粉

各少許

右另爲末和勻香油調成膏伺兒睡着時搽上
眉間便不思乳汁分難斷者不過再傳卽不思
乳矣

治小兒乳嗽

杏仁

桑白皮

桃核肉

半夏

甘艸

各等分

右生薑薄芎同煎此方得仲德抄吳氏方

大連翹飲

連翹

羌活

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

活石

蟬蛻

甘草

炙各一錢

山梔仁

黃芩

各五分

右劉細每服一錢加紫草煎溫服。熱甚加大
更許症加減爲佳。

化風丹

荆芥

黃芩

防風

羌活

獨活

天麻

膽南星

川芎

辰砂

甘艸

俱減半

右末蜜丸如芡實大每服一九薄荷湯
方加白附子全蝎殭蠶三味。

玄參劑

芍藥

玄參

升麻

地黃

甘州

黃芩

龍腦葉

山梔

連翹

各等分

右末蜜丸辰砂為末丸如芡實大每服一九薄荷湯送下。

四聖散

黃芪

炙

芍

加當歸散加桔梗

紅綿散

合有甘州

全蝎

天麻

蘇木

麻黃

荆芥

蘇砂

僵蠶

南星

乾葛

胭脂

熱加防風

右各等分。綿包生薑薄苧煎服。

大麻丸

治乳事

天麻

辰砂

防風

膽星

各錢

天竺黃

白附子

煨 煨

雄黃

蟬退

殭蠶

各五

川芎

礞砂

各七分半

右爲末蜜丸金清木。加牛黃片腦九如芡實大。每服一丸。薄荷湯化下。

常用藥方歌括

敗毒羌柴獨活前芎苓參桔及甘煎疹加風苛
并蟬退腰痛桃仁任意添

五積六蒼三桔梗兩半麻陳枳殼并一兩朴薑
三分夏歸芍芷桂及甘苓薑煎加入柴芫貝參
朮同成輕骨名調中苓葛葉甘苓芍梗仍兼白
朮平壯熱惡風并入利或時脈數此爲靈

參蘇苓夏葛前芷枳梗陳甘呆二參薑棗煎來
隨意服大能發散更消痰去却參呆芎用四前

柴互換亦相堪。名香蘇散

平胃甘三陳朴膏八蒼薑棗或鹽調不換金須
加藿夏養胃參苓果莫饒

消風百解芷陳荆蒼朮麻甘薑便成

金沸麻前各用三芍甘夏一四荆參或除麻葛
換辛荑同治傷風嗽有痰

梔子仁知苟大青四芩高杏及苓升八兼柴六
甘須二陽毒傷寒薑豉成

解肌甘一芍苓二桂一甘三同葛前壯熱惡風

身體痛脉浮無汗此爲先

香蘇四分陳皮二甘一或加芩芷煎更入麻黃
升芍藥十神只要葛多添

柴胡石膏須用四葛芍柴胡元不異升一苓桑
荆芥三薑豉同煎古賢置

萎茹三分高須四葛二微羌和杏芩甘與青朮
同葛數水煎對症有神功

縮脾砂果梅甘二豆葛祇消一分參水煎暑傷
還取症來看兒童花豆成

小續命湯

麻黃湯藥同防己麻桂甘苓二分童便一風三
薑棗煮剛桑二瘕竝能攻。

八解胃君四同去蒼加藿。

五苓猪茯苓皆三瀉五還將桂二參。

乾葛二芍餘竝一。參朮苓枳甘藿參此是小方。

白朮散渴兼吐利變風癰。

薄荷四芍羌蝎麻甘蠶一分亦同加竹葉白附。

還須二薄荷湯調驚熱差或去蝎蠶天竹附柴。

苓芩梗代尤佳。

紅綿散

麻薑芩芷天麻二蘇木甘全蝎一科。綿煎對症
明加減愈却傷風咳嗽驚。

大連翹飲

連翹荆芥通車芍。歸活風柴蟬共甘等分。槐花
還減半煎。須柴艸正相舉。

知母乾葛湯

知母三錢乾葛八六高麻四五菱科。甘苓風活

星皆一。呆杏升參芩不殊。

排風三味先爲主獨活麻苓三分同。杏朮當歸
甘桂芍藥皮二分共防風。薑錢作使煎來服五
臟風傷盡解攻。

木香流氣念三股十六陳皮裏獨單。通四若加
檳菓藿丁皮呆桂腹蓬三朴蘇甘附青皮八餘
藥皆同二分參苓朮麥瓜葛與芷棗薑作使藥
方元滑利米煎蔥解表。婦人艾醋血癥安。一方
去藿沉香代枳換黃芩。必炒乾增大黃能治

霜纒應念四請詳看

眼方

花 龍子

黃蘗

黃連

黃芩

右四味搗爲細末貼在碗底上用艾火燻之取
起稍加水用紙蓋水上取清水點眼內立效

治心痛

白烏雞糞

五錢麝乾研
細羅成麪

松粉

五錢
研細

右用葱根汁將前二味合勻爲丸如桐子大黃
爲衣每服五丸溫醋送下忌腥冷硬物等件

第四日立效。

備急經驗方

治破傷風極有神效。

余昔聞本縣大尹張公會言。吾有一妙方。專治破傷風。單只一味。極有神效。用人家糞內。蟬蛻蟲一箇。爛草房上亦有之。將他脊背。用手捏住。持他口中吐水。就擦抹在瘡口上。覺麻。身上汗出。無有不活者。及今余家第四子。忽於額上跌破一處。七日成風。急尋此蟲治之。時間汗出。就

好余有感於此不敢隱昧恐損陰陽就刊此傳
之將與用過還埋糞內

治搭背瘡極有神效

用生蜂蜜和生麪爲餅貼于瘡上待餅乾再換
三五次卽愈瘡有口者將麪餅亦口上貼之

治小兒痘疔

珍珠

生爲細末

豌豆

燒爲細末

頭髮

燒灰細末

濕胭脂

生用

右量疔瘡多少加減爲用將四味和爲一處先
用簪尖撥疔口次將此藥貼入疔內卽時大小

瘡皆變爲紅白色而無有不活者。大凡人家小兒出痘瘡若灰黑頂者十八九死。爲鄉人者不諳內有痘疔。又不曉治法故也。余昔日曾訪問諸多良醫。皆言痘瘡未出全者有藥可表。及瘡出後有灰黑色塌頂者皆無方可治之。今要認出黑色內有瘡大者爲疔。或瘡內有疔縫者爲疔。又有瘡內臭氣者爲疔。亦有數等。若依此方治之。立有神效。此方治好多人。倘有好事君子。傳寫四方。貼于街市而共治之。則福慶延長。子

孫保安矣

又方治小兒出痘

穿山甲剉細用蚌粉入鉢內炒令黃色存性研細入麝少許每半錢一錢溫酒調服其效若神雖遍身黑而欲絕亦能甦省而發紅色

治小兒瘡疹不透陷伏危困者

人牙齒三五箇炙令黃爲末乳香湯送下燒過爲末溫酒調下亦可服諸片時其便發透

治痘瘡後眼方

羌活

防風

川芎

各二錢半

甘艸

二錢

木賊

萊豆殼

荊芥

各三錢

蟬退

錢

谷精草

錢二 蛇退

雞子殼薄皮

各一錢

右爲末清茶調下。日三服。一應瘡翳皆可磨退。

治小兒夜啼

燈芯

七個

硼砂

二分五厘

硃砂

少許

右研極細末。蜜調成膏候小兒困時以少許抹

口唇上

附葵菜治痘神方

葵一名甜菜。一名女菜。一名滑菜。一名蒼蓬莖。
百菜之主也。四時可種。爲蔬。秋種者更佳。故冬
葵子尤爲藥品。所尚。嘗閱本草綱目。李氏開載
葵菜療痘之功。萬不失一。而歷代流傳。疑信相
貿。遂從菜部改入草部。且因葵性寒滑。恐傷脾
胃。不敢輕試。遂令對病妙藥。棄置不用。而惡毒
流染。坐致痿頓。心甚爲之。久有此疑。無從辨識。
十數年間。廣詢博訪。乃知爲甜菜。無疑。問令童
稚。餌之。雖無傷害。而功效未顯。未敢輕傳。比年

以來數經此症盛行。見不治者十有八九。而嘗
食此藥者。百無一失。乃知相傳之訛。致神功之
久遠也。可勝慨哉。方敢形之諸著。以廣其傳。嗟
乎。因慎重而坐。令陸沉。因未廣而猶然。胥溺。夫
今不傳。後悔奚及。乃開列其方。以公諸天下。後
世蓋其寒涓者。性也。洩利者。毒也。與脾胃根本
何與。且未病而先藥。病受之。病去本完。能爲上
策。卽見點而後食。猶將收大半之効。不猶愈於
坐觀薪盡者乎。又豈若俗醫見危。迫而進。其連

慘均剗刃者乎。噫。是在信不信。試不試之間耳。安敢以人命爲等閑。而冀其術之必售乎。其法采此菜。熟之以供蔬食。愈久愈佳。余所爲懇懇。款款。祈人之必信。必傳者。聊以追逋慢之愆。而爲不可復生者。志痛耳。余何慕焉。

天啓乙丑歲三月吉旦。慈溪松梁山人姜應麟筆記。

解胎毒免小兒痘疹

既除夕。或立春前一夜。將小鯽魚二三寸長者。

用竹刀去鱗去腸以芫荽納入魚腹中存瓦器
中煖煮令小兒食之終身不出痘

又方

以雞子在糞清中夏月二日冬月七日浸過玃
起令小兒空心熟食七枚亦免出痘